

PROCAPEN

300 mg/ml

Procaini benzylpenicillinum
Injekční roztok pro skot, prasata, koně.

TO, CO JE VÝJIMEČNÉ



PROCAPEN inj. ad us.vet. Injekční roztok pro skot, prasata, koně. **Složení:** Procaini benzylpenicillinum monohydricum 300 mg/ml. **Indikace:** Léčba infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými k benzylpenicilinu. **Dávkování a způsob podání:** Skot: 20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm. Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze. Telata: 15–20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 0,75–1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm. Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze. Prasata: 20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm. Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 10 ml injekční suspenze. Koně: 15 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 0,5 ml přípravku i.m./10 kg ž.hm. Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze. Délka léčby 3 dny s aplikací každých 24 hodin. **Ochranná lhůta:** Skot: Maso: 14 dnů. Mléko: 6 dnů. Prasata: Maso: 15 dnů. Koně: Maso: 14 dnů. Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. **Balení:** 100 ml.



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622
+420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz