

EFICUR

Ceftiofur hydrochlorid



Dr. Bubeniček

více než ÚČINNÉ antibiotikum



EFEKTIVNÍ VE VYUŽITELNOSTI

Nejlepší díky svým výhodám

Balení:

- * 100 ml
- * 250 ml s ochranným protektorem

EFEKTIVNÍ V PRAXI

Větší uplatnění
na produkčních
farmách skotu a prasat

Ochranné lhůty:



Mléko: 0 dní

Jeden z cefalosporinů
s nejkratší ochrannou lhůtou



TECHNOLOGICKY UPRAVENÝ

pro bezproblémové podání

- * Velmi dobře aplikovaná suspenze
- * Snížení stresu zvířat po podání
- * Možnost ošetření více zvířat v krátkém čase

EFICUR 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot. SLOŽENÍ: Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50 mg/ml.

INDIKACE: Infekce vyvolané bakteriemi citlivými k ceftiofuru: Prasata - léčba respiračního onemocnění vyvolaného *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* a *Streptococcus suis*. Skot - léčba respiračního onemocnění vyvolaného *Mannheimia haemolytica* (dříve pod názvem *Pasteurella haemolytica*), *Pasteurella multocida* a *Haemophilus somnus*. Léčba akutní interdigitální necrobacilózy (panaritium, putrefakce paznehtu), vyvolaného *Fusobacterium necrophorum* a *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*). Léčba bakteriálního komponentu akutní poporodní (puerperální) metritidy vyvolané *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* a *Fusobacterium necrophorum* do 10 dnů po otelení. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT: Prasata a skot. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH A ZPŮSOB PODÁNÍ: Prasata - 3 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 dní, tj. 1 ml na 16 kg ž.hm., intramuskulárně. Skot - léčba respiračního onemocnění: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 až 5 dnů, tj. 1 ml/50 kg ž.hm./den, subkutánně. Léčba akutní interdigitální necrobacilózy: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 dnů, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm./den, subkutánně. Léčba akutní poporodní metritidy v období 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 5 následujících dnů, tj. 1 ml/50 kg ž.hm./den, subkutánně. Další podání musí být aplikováno na rozdílná místa. V případě akutní poporodní metritidy je v některých případech nutno nasadit další podpůrnou léčbu. OCHRANNÁ LHŮTA: Mléko - bez ochranných lhůt. BALENÍ: 100 ml, 250 ml s ochranným protektorem. Registrováno také ve Slovenské republice.

Dr. Bubeniček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104
628 00 Brno
tel./fax:
+420 544 231 413

mobil:
+420 737 118 749
+420 602 586 622
e-mail: info@bubeniczek.cz
www.bubeniczek.cz