



BOFLOX FLAVOUR

VŠE CO OTŘEBUJÍ

Marbofloxacin v tabletách, určeno pro kočky a psy

Spolu s Vámi

BOFLOX FLAVOUR



MARBOFLOXACIN V TABLETÁCH,
URČENO PRO KOČKY A PSY
PŘÍPRAVEK SPLŇUJÍCÍ VAŠE POŽADAVKY

TABLETY S PŘÍCHUTÍ

Chutné tablety
ve dvou příchutích

- hovězí maso
- droždí

Tablety neobsahují
živočišnou bílkovinu ani lepek.



DĚLITELNÉ TABLETY

20 mg tablety – kulaté béžové tablety s hnědými tečkami a křížovou dělicí rýhou. Tablety lze dělit na dvě poloviny nebo čtyři čtvrtiny.

80 mg tablety – oválné béžové tablety s hnědými tečkami a dělicí rýhou. Tablety lze dělit na dvě poloviny.

SKUTEČNÉ PARAMETRY TABLET

PRŮMĚR
CCA 9,1 MM

PRŮMĚR
CCA 20,6 MM

1 tableta 20 mg

>2,5 kg

5 kg

7,5 kg

10 kg



1 tableta 80 mg

20 kg

40 kg



20 mg

80 mg





INDIKACE

Infekce kůže a měkkých tkání.

Způsobené: Staphylococcus spp. (S. aureus a S. intermedius), E. coli, Pasteurella multocida a Pseudomonas aeruginosa.

Psi:

Pyodermie kožních záhybů, impetigo, folikulitida, furunkulóza, celulitida. Léčba od 5 do 40 dnů.

Kočky:

Rány, abscesy, flegmóny. Léčba od 3 až 5 dnů.

Infekce dýchacího ústrojí.

Způsobené: Pasteurella multocida, Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella pneumoniae), Staphylococcus spp. (S. aureus a S. intermedius), Pseudomonas aeruginosa, Bordetella bronchiseptica a Streptococcus spp.

Psi:

Léčba od 7 do 21 dnů.

Kočky:

Léčba 5 dnů.

Infekce močového ústrojí.


Způsobené: Staphylococcus spp. (S. aureus a S. intermedius), Streptococcus spp., Enterobacteriaceae (E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae) a Pseudomonas aeruginosa.

Psi:

Zánět prostaty či nadvarlete. Léčba od 10 do 28 dnů.

DVĚ SÍLY ZABEZPEČUJÍCÍ VŠECHNY VELIKOSTI ZVÍŘAT

Potřebujete jen tyto dvě koncentrace (20 mg, 80 mg) k terapii jakékoliv velikosti cílových zvířat.



PERFOROVANÉ BLISTRY

Jednoduché použití díky perforovaným blistrům.



BOFLOX FLAVOUR

MARBOFLOXACIN V TABLETÁCH, URČENO PRO KOČKY A PSY



- tablety s příchutí
- dělitelné tablety

- tablety ve dvou silách

- perforované blistry

Boflox flavour 20 mg tablety pro psy a kočky **Boflox flavour 80 mg tablety pro psy a kočky**

Přípravek s indikačním omezením.

Léčivá látka: Marbofloxacinum
20 mg/80 mg/1 tableta.

Léková forma: Tableta. Kulaté béžové tablety s hnědými tečkami a křížovou dělicí rýhou. Tablety lze dělit na dvě poloviny nebo čtyři čtvrtiny.

Cílové druhy zvířat: psi, kočky.

Indikace: Léčba infekcí způsobených kmeny mikroorganismů citlivými k marbofloxacinu.

- U psů:
- infekce kůže a měkkých tkání (pyodermie kožních záhybů, impetigo, folikulitida, furunkulóza, celulitida);
 - infekce močového ústrojí se zánětem prostaty či nadvarlete nebo bez jejich souvislosti;
 - infekce dýchacího ústrojí.
- U koček:
- infekce kůže a měkkých tkání (rány, abscesy, flegmóny);
 - infekce horních cest dýchacích.

Kontraindikace: Marbofloxacin nesmí být používáno u psů mladších 12 měsíců, respektive mladších 18 měsíců u obřích plemen psů, jako jsou dogy, briardi, bernští salašníčtí psi, bouvieri a mastifové s delším obdobím růstu. Nepoužívat u koček mladších 16 týdnů. Nepoužívat při přecitlivělosti na fluorochinolony nebo některou z pomocných látek přípravku. Nepoužívat v případech potvrzené rezistence původců k fluorochinolonům nebo v případech, kdy na rezistenci existuje podezření (zkřížené rezistence). Není vhodné u infekcí způsobených striktními anaeroby, kvasinkami nebo plísněmi.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh: Nízká hodnota pH moči může snižovat účinek marbofloxacinu.

Zvláštní opatření pro použití: Bylo prokázáno, že fluorochinolony vyvolávají u mladých věkových kategorií psů eroze kloubní chrupavky a je proto nutné dodržovat správné dávkování, zejména u mladých zvířat. U fluorochinolonů jsou také známé nežádoucí neurologické účinky. U psů a koček, u nichž byla diagnostikována epilepsie, se proto doporučuje zvýšená opatrnost při použití.

Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu nebo kdy se očekává, že budou mít slabou odezvu na jiné farmakologické skupiny antimikrobních léčiv.

Kdykoliv je to možné, fluorochinolony by se měly používat na základě stanovení citlivosti. Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence kmenů bakterií rezistentních na fluorochinolony a může snížit účinnost léčby ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

Nežádoucí účinky: Při doporučených dávkách se u psů a koček neočekávají žádné závažné nežádoucí účinky. V klinických studiích nebyly při doporučených dávkách zjištěny žádné změny na kloubech. Nicméně, ve vzácných případech může dojít k bolestem kloubů nebo neurologickým potížím (ataxie, agresivita, křeče, deprese). Pozorovány byly alergické reakce (dočasné kožní reakce), které mohou nastat z důvodu uvolňování histaminu. Občas se mohou objevit mírné nežádoucí účinky jako je zvracení, změkčení stolice, změny žíznivosti nebo přechodné zvýšení aktivity. Tyto příznaky po léčbě spontánně vymizí a nevyžadují její přerušení.

Použití v průběhu březosti, laktace: U březích samic potkanů a králíků neprokázaly studie žádné vedlejší účinky na březost. Nicméně však nebyly provedeny žádné specifické studie u březích fen a koček. U zvířat březích a v laktaci používejte přípravek pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce: Jsou známé interakce mezi fluorochinolony a perorálně podávanými kationty (hliník, vápník, hořčík, železo). V takových případech může dojít ke snížení biologické dostupnosti.

Nepoužívat v kombinaci s tetracykliny a makrolidy z důvodu možného antagonistického účinku.

Při souběžném podávání teofylinu se poločas eliminace a tedy plazmatické koncentrace teofylinu zvýší. Proto je vhodné dávky teofylinu snížit.

Podávané množství a způsob podání: Perorální podání. Doporučené dávkování je 2 mg/kg ž. hm./den (1 tableta na 10 kg ž. hm./den nebo 1 tableta na 40 kg ž. hm./den) při

podávání jednou denně. Živou hmotnost je třeba stanovit co nejpřesněji, abyste zajistili správnou dávku a zabránili poddávkování.

Délka léčby: Psi: Při infekcích kůže a měkkých tkání je délka trvání léčby nejméně 5 dní. V závislosti na průběhu onemocnění lze tuto dobu prodloužit až na 40 dní. Při infekcích močových cest je délka trvání léčby nejméně 10 dní. V závislosti na průběhu onemocnění lze tuto dobu prodloužit až na 28 dní. U infekcí dýchacích cest je délka trvání léčby nejméně 7 dní. V závislosti na průběhu onemocnění může být prodloužena až na 21 dnů.

Kočky: Při infekcích kůže a měkkých tkání (rány, abscesy, flegmóny) je délka trvání léčby 3–5 dní.

Při infekcích horních cest dýchacích je délka trvání léčby 5 dní.

Ochranné lhůty: Není určeno pro potravinová zvířata.

Doba použitelnosti: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky. Doba použitelnosti zbylé poloviny nebo čtvrtiny tablety: 4 dny.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Blistry uchovávejte v původním obalu. Zbylé nepoužité poloviny nebo čtvrtiny tablet vraťte zpět do blistru. Všechny zbylé poloviny nebo čtvrtiny tablet po 4 dnech zlikvidujte.

Druh a složení vnitřního obalu: Blistry hliník/PA-hliník-PVC po 10 tabletách. Krabičky obsahující 10 tablet (1 blister), 20 tablet (2 blistry), 50 tablet (5 blistrů), 100 tablet (10 blistrů), 150 tablet (15 blistrů), 200 tablet (20 blistrů).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí:

LIVISTO Int'l, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Španělsko

Registrační číslo: 96/018/17-C

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.