


ANIMELOXAN

20 mg/ml

UHAŠTE ZÁNĚT VČAS

Meloxikam

Injekční roztok pro skot, prasata a koně



Vždy s Vámi

ANIMELOXAN

20 mg/ml

Meloxikam
Injekční roztok pro skot, prasata a koně


Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) se běžně používají ve veterinární praxi u hospodářských zvířat ke zmírnění negativních účinků zánětlivé kaskády, jako je nadměrné otoky, horečka a bolest.

Hlavním cílem podávání NSAID je zlepšení welfare zvířat a podpora návratu jejich produkční výkonnosti (např. mléčná užitkovost nebo růstová křivka), která bývá často narušena chronickou bolestí, zánětem a horečkou.

JAK MELOXIKAM PŮSOBÍ?

Meloxikam je nesteroidní protizánětlivý lék (NSAID), který působí inhibicí cyklooxygenázy-2 (COX-2) a má zbytkový účinek na cyklooxygenázu-1 (COX-1). Izoforma COX-1 podporuje tvorbu prostaglandinů, které mají ochrannou funkci ve sliznici žaludku, ledvinách, krevních destičkách a imunitních buňkách.

Specifická inhibice COX-2 umožňuje dosáhnout výrazného protizánětlivého, protihorečnatého a analgetického účinku s menším výskytem nežádoucích účinků spojených s inhibicí COX-1 (např. gastrointestinální obtíže).



✓ **Protizánětlivý účinek**
Protihorečnatý účinek
Inhibice prostaglandinů

✓ **Protizánětlivý účinek**
Antikoagulační účinek
Inhibice tromboxanu B2 (TXB2)

✓ **Protizánětlivý účinek**
Analgetický účinek
Selektivnější inhibice COX-2 znamená méně gastrointestinálních nežádoucích účinků.

Vyšší selektivita pro COX-2 znamená, že meloxikam poskytuje srovnatelný protizánětlivý účinek jako ostatní NSAID, ale s **menším výskytem gastrointestinálních nežádoucích účinků než NSAID bez selektivity pro COX-2.**



UHAŠTE ZÁNĚT VČAS



KDY POUŽÍT MELOXIKAM?

Indikace		
		
• Akutní respirační infekce ² • Průjem u telat ² • Akutní mastitida ^{3,4} • Odřehování ⁵ • Perioperační použití (císařský řez, chirurgické zákroky při kulhání) ⁵⁻⁷	• Neinfekční poruchy pohybového aparátu ⁴ • Poporodní septikémie a toxémie (syndrom mastitida-metritida-agalaktie) ⁴ • Tlumení bolesti po chirurgické kastraci ⁸ • Období okolo porodu ⁹ • Systémová infekční onemocnění ⁹	• Úleva od bolesti při chronických onemocněních pohybového aparátu a kloubů (kulhání, synovitida, osteoartritida...) ^{10,11} • Symptomatická analgetická léčba koliky (viscerální bolest) ⁴ • Pooperační bolest ¹² • Otoky (maligní edém) ¹¹

ANIMELOXAN 20 mg/ml je vhodnou volbou jako podpůrná terapie při onemocněních, která jsou provázena zánětem, bolestí, horečkou nebo otokem. S přípravkem **ANIMELOXAN 20 mg/ml** nedovolíte, aby plamen zánětu vzplál.



Skot

- s.c., i.v.
- 2,5 ml/100 kg ž.hm.
- Jedna dávka

Maso a vnitřnosti

15 dní
Mléko
5 dní



Prasata

- i.m.
- 2 ml/100 kg ž.hm.
- Jedna dávka

Maso a vnitřnosti

8 dní



Koně

- i.v.
- 3 ml/100 kg ž.hm.
- Jedna dávka

Maso a vnitřnosti

5 dní



Díky svým farmakokinetickým vlastnostem a prodlouženému účinku stačí k dosažení dobrého protizánětlivého efektu jediná dávka přípravku **ANIMELOXAN 20 mg/ml**.

ANIMELOXAN

20 mg/ml

Meloxicam

Injekční roztok pro skot, prasata a koně

UHASTE ZÁNĚT VČAS

**MÉNĚ GASTROINTESTINÁLNÍCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ
JEDINÁ DÁVKA**

Animeloxan, 20 mg/ml

Injekční roztok pro skot, prasata a koně

LÉČIVÁ LÁTKA:

Meloxicamum 20 mg/ml

INDIKACE

Skot:

K léčbě akutních respiračních infekcí u skotu v kombinaci s vhodnou terapií antibiotiky ke zmírnění klinických příznaků.

V kombinaci s perorální rehydratační terapií ke zmírnění klinických příznaků průjmu u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu.

K podpůrné terapii při léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky.

K zmírnění pooperační bolesti po odrohování telat.

Prasata:

Ke zmírnění příznaků kulhání a zánětů při neinfekčních onemocněních pohybového aparátu.

K podpůrné terapii při léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalaktie) v kombinaci s vhodnou terapií antibiotiky.

Koně:

K tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických onemocněních muskuloskeletálního aparátu.

K zmírnění bolesti spojené s kolikou.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT:

Skot, prasata a koně.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ:

Injekční roztok.

Skot:

Jednorázové subkutánní nebo intravenózní podání v dávce 0,5 mg meloxicamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,5 ml/100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo perorální rehydratační léčbou, je-li vhodná.

Prasata:

Jednorázové intramuskulární podání v dávce 0,4 mg meloxicamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml/100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky, jsou-li vhodná. V případě potřeby lze po 24 hodinách podat druhou dávku meloxicamu.

Doporučuje se změnit místo injekčního podání.



Koně:

Jednorázové intravenózní podání v dávce 0,6 mg meloxicamu/kg živé hmotnosti (tj. 3,0 ml/100 kg živé hmotnosti).

OCHRANNÉ LHŮTY:

Skot:

Maso: 15 dní. Mléko: 5 dní

Prasata:

Maso: 8 dní

Koně:

Maso: 5 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

POUŽITÍ V PRŮBĚHU BŘEZOSTI, LAKTACE NEBO SNÁŠKY:

Skot a prasata:

Lze použít během březosti a laktace.

Koně:

Nepoužívat u klisen během březosti a laktace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koní mladších 6 týdnů.

Nepoužívejte v případě poruchy funkce jater, srdce nebo ledvin či s krvácivými onemocněními nebo v případech, kdy jsou prokázány ulcerogenní gastrointestinální léze.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

K léčbě průjmu u skotu nepoužívejte u zvířat mladších jednoho týdne.

DOBA POUŽITELNOSTI PO PRVNÍM OTEVŘENÍ VNITŘNÍHO OBALU:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

VELIKOST BALENÍ:

1× 100 ml skleněná lahvička v kartonové krabici

Registrační číslo: 96/073/19-C



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622
+420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz