

CYLANIC

FAKTOR ÚŽASU

Amoxicilin a kyselina klavulanová
v tabletách pro psy a kočky



Vždy s Vámi

CYLANIC

Amoxicilin a kyselina klavulanová v tabletách pro psy a kočky

Širokospektrální antibiotikum indikované v případech:

- ❁ Kožních onemocnění (hluboká a povrchová pyoderma)
- ❁ Infekcí měkkých tkání (abscesy a zánět análních váčků)
- ❁ Onemocnění dýchacích cest (horních a dolních dýchacích cest)
- ❁ Zubních infekcí (zánět dásní – gingivitida)
- ❁ Infekcí močových cest
- ❁ Enteritidy

Kombinace amoxicilinu s kyselinou klavulanovou je účinná proti mnoha aerobním i anaerobním bakteriím, včetně:

❁ Grampozitivní bakterie:
Stafylokoky, streptokoky, peptostreptokoky, corynebakterie, klostridie.

❁ Gramnegativní bakterie:
E. coli, bakteroidy (Bacteroides spp.), Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Fusobacterium necrophorum, Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp.

Společnost LIVISTO podporuje obezřetné používání antibiotik.

Nevhodné používání antibiotik může zvýšit rezistenci bakterií a snížit účinnost léčby.

„Tak málo, aby to stačilo, tak mnoho, kolik je potřeba.“



FAKTOR ÚŽASU

➤ OCHUCENÉ TABLETY

Vanilková příchut' – výborná přijatelnost.

➤ VYSOCE KONCENTROVANÉ

Tablety mají vysokou koncentraci účinné látky – je potřeba menší množství podle hmotnosti zvířete.

CYLANIC je o 25 % koncentrovanější než většina tablet s amoxicilinem a kyselinou klavulanovou.

➤ 3 SÍLY ÚČINNÉ LÁTKY

Amoxicilin / Kyselina klavulanová

- 50/12,5 mg
- 250/62,5 mg
- 500/125 mg

Pro různé hmotnostní kategorie zvířat.

➤ HYPOALERGENNÍ

Neobsahuje živočišné produkty ani lepek.

➤ DĚLITELNÉ TABLETY

Lze rozdělit na 2 nebo 4 stejné části pro přesné dávkování.

➤ DĚLITELNÝ BLISTR

Perforované blistry usnadňují výdej, umožňují vydat přesné množství tablet bez potřeby odstříhování.



➤ Dávkování: 12,5 mg/kg živé hmotnosti, dvakrát denně

Standardní délka léčby: 5–7 dní.



3,75–5 kg:
1 tableta

50/12,5 mg



18,75–25 kg:
1 tableta

250/62,5 mg



37,5–50 kg:
1 tableta

500/125 mg

1 tableta pokrývá o 25 % více hmotnosti.

➤ U chronických nebo obtížně léčitelných případů může být nutná delší léčba:

- Chronická kožní onemocnění: 10–20 dní
- Chronická cystitida: 10–28 dní
- Onemocnění dýchacích cest: 8–10 dní

CYLANIC

Amoxicilin a kyselina klavulanová
v tabletách pro psy a kočky




FAKTOR ÚŽASU

**OCHUCENÉ
TABLETY**

**VYSOCE
KONCENTROVANÉ**

**DĚLITELNÝ
BLISTR**



CYLANIC

Amoxicilin a kyselina klavulanová v tabletách pro psy a kočky

Složení:

Amoxicillinum (jako amoxicillinum trihydricum), acidum clavulanicum (jako kalii clavulanas) 50 + 12,5 mg, 250 + 62,5 mg, 500 + 125 mg

Cílový druh zvířat:

Psi a kočky.

Indikace:

Léčba infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými ke kombinaci amoxicilinu s kyselinou klavulanovou zahrnující: kožní infekce (včetně hlubokých a povrchových pyodermií); infekce měkkých tkání (abscesy a anální sakulitida); dentální infekce (např. gingivitida); infekce močových cest; respirační onemocnění (postihujícího horní a dolní dýchací cesty) a enteritidy.

Kontraindikace:

Nepoužívat u králíků, morčat, křečků, pískomilů a činčil. Nepoužívat ve známých případech přecitlivělosti na léčivé látky, na jiné antimikrobiální přípravky β-laktamové skupiny nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat u zvířat se závažně poškozenou funkcí ledvin provázenou anurií a oligurií. Nepoužívat u přežvýkavců a koní.

Nežádoucí účinky:

Občas se mohou vyskytnout alergické reakce (kožní reakce, anafylaxe). V těchto případech je nutné podávání přerušit a zahájit symptomatickou léčbu. Podání přípravku může mít ve velmi vzácných případech za následek gastrointestinální poruchy (zvracení, průjem, anorexii).

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání:

Perorální podání. Doporučená dávka je 12,5 mg/kg živé hmotnosti (10 mg amoxicilinu/2,5 mg kyseliny klavulanové na kg živé hmotnosti), dvakrát denně. Následující tabulka je návodem k podávání tablet v doporučeném dávkování.

Aby se zajistilo správné dávkování a zabránilo poddávkování je třeba stanovit živou hmotnost zvířete co nejpřesněji.

Živá hmotnost (kg)	Počet tablet podávaných dvakrát denně (dávkování: 12,5 mg/kg ž. hm.)		
	Amoxicilin/kyselina klavulanová		
	50 mg + 12,5 mg	250 mg + 62,5 mg	500 mg + 125 mg
1–1,25	¼	-	-
> 1,25–2,5	½	-	-
> 2,5–3,75	¾	-	-
> 3,75–5	1	-	-
> 5–6,25	1¼	¼	-
> 6,25–12,5	-	½	¼
> 12,5–18,75	-	¾	-
> 18,75–25	-	1	½
> 25–31,25	-	1¼	-
> 31,25–37,5	-	1½	-
> 37,5–50	-	-	1
> 50–62,5	-	-	1¼
> 62,5–75	-	-	1½

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu. Pokud tablety dělíte, zbývající části tablety nechte v blistru.

Balení:

50 mg + 12,5 mg – 100 tablet, 250 mg + 62,5 mg – 100 tablet, 500 mg + 125 mg – 100 tablet



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622
+420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz