




Porovnání CEFTIOFURŮ RTU

Srovnávací graf syringeability, založený na době potřebné k vypuzení 10 ml přípravku při použití stejného typu stříkačky.

Použitá stříkačka: 10ml skleněná stříkačka (Fortuna, Optimal H) s 17G jehlou (1,5 × 15 mm, 17G × 1/2", 15 × 15 mm).


K dosažení správného tlaku pro zajištění konstantního vypuzení obsahu stříkačky byla použita síla 200 g.



Studie firmy ID-03586 a ID-02818

U přípravků E, C, R bylo pozorováno ucpávání obsahu lékovky (docházelo k přerušení plynulého proudění a přechodu na odkapávání).

Srovnávací graf viskozity přípravků




Studie firmy ID-03586 a ID-03635

Výsledek: Přípravek Eficur® má nižší viskozitu (je kapalnější) při všech měřených teplotách.



Posouzení resuspendace a sedimentace



Studie firmy ID-02818 a ID-03635

Data ukazují, že u přípravku Eficur® dochází k pomalejší sedimentaci a lepší resuspendaci než u přípravků E, C a R.

Eficur® – alternativa s jasnými výhodami:

- Různé velikosti balení: 100 ml, 250 ml
- Účinnost přípravku
- Vynikající syringeabilita
- Rychlá a snadná aplikace
- Možnost ošetřit více zvířat za kratší dobu
- Snížená zátěž pro ošetřovatele
- Optimální resuspendace
- Nižší a pomalejší sedimentace
- Přesné dávkování
- Přesně stanovené ochranné lhůty:
 - Prasata – maso a vnitřnosti: 5 dní
 - Skot – maso a vnitřnosti: 8 dní
 - Mléko: 0 dní

