

EFICUR®

Ceftiofur hydrochlorid
Injekční suspenze



„Nepřežívá nejsilnější druh, ani ten nejinteligentnější.
Přežívá ten, kdo se nejlépe přizpůsobí změně.“

Charles Darwin




Nové, odolnější balení

EVOLUČNÍ VÝHODA

Široká škála balení

- Navrženo s ohledem na potřeby všech zákazníků

- Univerzální a flexibilní použití
- Odolné provedení minimalizuje riziko rozbití



I think
Then between A & B. various size & relation. C + B. the front predation, B + D rather greater distinction than former would be formed. - bearing relation

Then between A & B. various front predation, rather B. the distinction than former would be formed. - bearing relation




EFICUR se mění
Nové, odolnější PET balení


Efektivita složení

▪ Optimální vlastnosti pro aplikaci injekčně i při nízké teplotě

Srovnání aplikovatelnosti injekční stříkačkou (při teplotě $4 \pm 3^\circ\text{C}$)




Porovnání viskozity



- Rychlé a snadné podání
- Umožňuje ošetřit více zvířat za kratší dobu
- Snižuje riziko stresu

Srovnání resuspenze a sedimentace



- Nižší a pomalejší sedimentace
- Lepší resuspenze
- Přesné dávkování

EFICUR[®]

Ceftiofur hydrochlorid
Injekční suspenze

- Různé varianty balení
- Snadná aplikace injekční stříkačkou i při nízkých teplotách
- Vynikající resuspendovatelnost



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

EFICUR 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot. Přípravek s indikačním omezením. **OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK:** 1 ml obsahuje: Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50 mg. EFICUR je bílá nebo nažloutlá olejová suspenze. **INDIKACE:** Infekce vyvolané bakteriemi citlivými k ceftiofuru: **Prasata:** léčba respiračního onemocnění vyvolaného *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* a *Streptococcus suis*. **Skot:** léčba respiračního onemocnění vyvolaného *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* a *Histophilus somni*. Léčba akutní interdigitální necrobacilózy (panaritium, foot rot), vyvolaného *Fusobacterium necrophorum* a *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*). Léčba bakteriální složky akutní poporodní (puerperální) metritidy vyvolané *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* a *Fusobacterium necrophorum* do 10 dnů po telení (omezeno na případy, kdy selhala léčba jiným antimikrobiálním přípravkem). **KONTRAINDIKACE:** Nepodávat zvířatům, u nichž byla zjištěna přecitlivělost k ceftiofuru a jiným β -laktamovým antibiotikům. Nepodávat intravenózně. Nepoužívat u drůbeže (včetně vajec) z důvodu rizika rozšíření rezistence k antibiotikům na člověka. **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:** Viz příbalová informace. **CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT:** Prasata a skot. **DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ:** **Prasata:** 3 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 dnů, tj. 1 ml/16 kg ž.hm., i.m. **Skot:** Léčba respiračního onemocnění: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 až 5 dnů, tj. 1 ml/50 kg ž.hm./den, s.c. Léčba akutní interdigitální necrobacilózy: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 dnů, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm./den, s.c. Léčba akutní poporodní metritidy v období 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 5 po sobě jdoucích dnů, tj. 1 ml/50 kg ž.hm./den, s.c. Následná injekční podání musí být aplikována na rozdílná místa. V případě akutní poporodní metritidy je v některých případech nutno nasadit další podpůrnou léčbu. **POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ:** Před použitím dobře protřepejte, aby došlo opětovně k vytvoření homogenní suspenze. Zabarvení skleněné látky nemusí být stejné a může způsobit obtížnější stanovení, kdy je přípravek v homogenní suspenzi. **OCHRANNÁ LHŮTA:** Prasata: Maso: 5 dnů. Skot: Maso: 8 dnů. Mléko: Bez ochranných lhůt. **ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ:** Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP. **VELIKOST BALENÍ:** 100 ml, 250 ml. Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.