



FICOXIL

ODSURFUJTE OD BOLESTI

Firocoxib žvýkácí tablety pro psy

Vždy s Vámi

FICOXIL

Firocoxib žvýkáci tablety pro psy

OSTEOARTRITIDA

Osteoartritida (OA) je progresivní degenerativní onemocnění kloubů charakterizované bolestí a postižením spojeným s destrukcí kloubní chrupavky a remodelací kostí.

Běžně postihuje starší psy a nadměrná tělesná hmotnost (obezita) může způsobit exacerbaci choroby.

FICOXIL obsahuje jako účinnou látku firocoxib, patřící do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), konkrétně do skupiny coxibů.

Cílem léčby je zmírnit bolest a zánět. Lékem lze udržovat mobilitu a kvalitu života psa.

Cílem léčby je snížení bolesti a zánětu, zabezpečení pohyblivosti psa a zlepšení kvality jeho života.

Kolení kloub zadních končetin psa se podobá lidskému kolenu. Kostí jsou drženy na svých místech vazy. Tento kloub se nejčastěji poraní.

Rameno je kulovitý kloub. Jedná se o časté místo opotřebení.

Hlezno se podobá lidskému kotníku. Tyto kosti jsou namáhány, když zvíře běhá a skáče.

V loketním kloubu se spojují 3 kůstky do tvaru pevného kloubu. Tento kloub může podléhat deformacím.



Molekula firocoxibu má analgetické, protizánětlivé a antipyretické účinky, které zlepšují skóre bolesti a úlevy od zánětu.


FICOXIL je indikován k úlevě od:

- **Bolesti a zánětu, které jsou spojeny s osteoartritidou.**
- **Pooperační bolesti a zánětu měkkých tkání po ortopedických a stomatologických zákrocích u psů.**





ODSURFUJTE OD BOLESTI



Perforovaný blistr

Pro snadné podání.



2 balení pro každou hmotnost

57 mg a 227 mg



Dělitelné tablety

Tablety lze dělit na 2 a 4 stejné díly.



Ochucené žvýkací tablety

Příchuť hovězího masa bez živočišných přísad.




Méně nežádoucích účinků na trávicí trakt.

Nižší než u ostatních NSAID.



Hypoalergenní, neobsahuje lepek.



FICOXIL je selektivní inhibitor skupiny COX-2.

Tělesná hmotnost (kg)	Ficoxil 227 mg	
	Počet tablet denně	
10–17	1/4	
> 17–28	1/2	
> 28–39	3/4	
> 39–51	1	
> 51–62	1 + 1/4	
> 62–73	1 + 1/2	
> 73–85	1 + 3/4	
> 85–96	2	

Tělesná hmotnost (kg)	Ficoxil 57 mg	
	Počet tablet denně	
3–4	1/4	
> 4–7	1/2	
> 7–10	3/4	
> 10–12,5	1	
> 12,5–15,5	1 + 1/4	
> 15,5–18,5	1 + 1/2	
> 18,5–21	1 + 3/4	
> 21–24	2	

DOBA TRVÁNÍ LÉČBY

Osteoartritida: Protože studie v terénu byly omezeny jen na 90 dní, delší léčba musí být pečlivě zvážena. Veterinární lékař musí provádět pravidelné monitorování zvířete.

Úleva od pooperační bolesti: Až 3 dny podle potřeby, počínaje 2 hodiny před operací.

Léčba by měla pokračovat bez přerušení ještě několik dní po úplném odeznění klinických příznaků.



DÁVKOVÁNÍ:

5 mg na kilogram živé hmotnosti jednou denně.

FICOXIL

ODSURFUJTE OD BOLESTI DĚLITELNÉ HYPOALERGENNÍ TABLETY



FICOXIL

Ficoxil žvýkáci tablety pro psy. Firocoxibum

Složení:

Ficoxil 57 mg:	Firocoxibum	57 mg
	Červený oxid železitý (E172)	0,131 mg
	Žlutý oxid železitý (E172)	0,056 mg
Ficoxil 227 mg:	Firocoxibum	227 mg
	Červený oxid železitý (E172)	0,525 mg
	Žlutý oxid železitý (E172)	0,225 mg

Cílový druh zvířat:

Psi.

Indikace:

Úleva od bolesti a zánětu spojených s osteoartritidou u psů.

Úleva od pooperační bolesti a zánětu spojených s operacemi měkkých tkání, ortopedickými operacemi a dentálními chirurgickými zákroky u psů.

Kontraindikace:

Nepoužívat u březích fen nebo fen v laktaci.

Nepoužívat u psů mladších 10 týdnů nebo s hmotností nižší než 3 kg.

Nepoužívat u psů s gastrointestinálním krvácením, krevní dyskrázií nebo s hemoragickými poruchami.

Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními antiflogistiky (NSAIDs).

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky:

Příležitostně se vyskytly zvracení a průjem. Tyto příznaky mají zpravidla dočasný charakter a odezní po zastavení léčby. Ve velmi vzácných případech se u psů, kterým byla podána doporučená léčebná dávka, objevily ledvinové nebo jaterní poruchy. U léčených psů byly v mimořádných případech zaznamenány poruchy nervového systému.

Objeví-li se nežádoucí reakce, jako zvracení, opakující se průjem, okultní krev ve stolici, náhlý úbytek váhy, nechutenství, letargie, zhoršení biochemických parametrů funkce ledvin nebo jater, podávání přípravku by mělo být zastaveno a je na místě konzultace s veterinárním lékařem. Stejně jako u jiných nesteroidních antiflogistik se mohou objevit závažné nežádoucí účinky, které mohou být ve velmi vzácných případech fatální.

Dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání:


Podat 5 mg firokoxibu na kg živé hmotnosti jednou denně.

K úlevě od pooperační bolesti a zánětu, může být první dávka podána zvířatům přibližně 2 hodiny před operací. Podává se maximálně 3 následující dny tak, jak je potřeba. Následně

po ortopedické operaci a v závislosti na terapeutické odpovědi může léčba, respektující stejné denní dávkovací schéma, po prvních 3 dnech pokračovat. Podle uvážení ošetřujícího veterinárního lékaře.

Pro perorální podání podle níže uvedené tabulky, která je míněna jako vodítko pro podávání veterinárního léčivého přípravku v doporučené dávce.

Tablety je možné rozdělit na 2 nebo 4 stejné části a zajistit tak přesné dávkování.



Živá hmotnost (kg)	Počet tablet podle síly		Rozmezí mg/kg
	227mg	57 mg	
3,0–5,5		1/2	5,2–9,5
5,6–7,5		3/4	5,7–7,6
7,6–10	1/4	1	5,7–7,5
10,1–13		1 1/4	5,5–7,1
13,1–16		1 1/2	5,3–6,5
16,1–18,5		1 3/4	5,4–6,2
18,6–22,5	1/2		5,0–6,1
22,6–34	3/4		5,0–7,5
34,1–45	1		5,0–6,7
45,1–56	1 1/4		5,1–6,3
56,1–68	1 1/2		5,0–6,1
68,1–79	1 3/4		5,0–5,8
79,1–90	2		5,0–5,7

Pokyny pro správné podání:

Tablety mohou být podávány v krmivu i bez něj. Nepřekračujte doporučenou dávku. Doba trvání léčby závisí na pozorovaném účinku. Jelikož prováděné studie nepřesáhly 90 dnů, dlouhodobější léčba musí být dobře zvážena a vyžaduje pravidelnou veterinární kontrolu.

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Veškeré zbývající části tablety je třeba vrátit do blistry a příští dávku podat do 7 dnů.



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622
+420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz