



HEDYLON

5 mg a 25 mg

MUSÍTE MÍT VE SVÉ KLINICE

Prednisolon
Tablety pro psy a kočky

Vždy s Vámi

Prednisolon

Prednisolon je systémový glukokortikoid, který se v dermatologické praxi používá především u různých onemocnění včetně alergií, autoimunitních procesů a některých nádorových onemocnění.



Kdy se doporučuje použít prednisolon?

Alergie



Parazitická



Alimentární



Životní prostředí



Atopická dermatitida

Zánětlivé/autoimunitní stavy




Imunologicky mediované

Podílí se na několika projevech onemocnění:

- Kožní
- Alimentární
- Respirační
- Muskuloskeletální
- Hematologická

HEDYLON

Tablety pro psy a kočky



Easy-tab

- Dělitelné tablety pro snadné podávání a přesné dávkování

Pouze 2 síly pro všechny velikosti

DÁVKOVÁNÍ: 0,5–2 mg/kg/24 hod

Při dávce 0,5 mg/kg:



5 kg = ½ tablety 5 mg



10 kg = 1 tableta 5 mg

5 mg

kočky/malí psi

Při dávce 0,5 mg/kg:



12,5 kg = ¼ tablety 25 mg



25 kg = ½ tablety 25 mg



50 kg = 1 tableta 25 mg

25 mg

střední a velcí psi

Dávkování je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo použití nejnižší účinné dávky.

Perforovaný blistr



HEDYLON

**Prednisolon 5 mg a 25 mg
v tabletách pro psy a kočky**



MUSÍTE MÍT VE SVÉ KLINICE DĚLITELNÉ TABLETY V PERFOROVANÉM BLISTRU

HEDYLON 5 mg a 25 mg tablety
Prednisolon 5 mg a 25 mg

Léková forma:

Tableta. Bílé kulaté tablety s křížovou dělicí rýhou na jedné straně a s vyraženým číslem 5 na druhé straně. Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné části.

Druhy:


Psi a kočky

Indikace:

K symptomatické léčbě nebo jako doplňková léčba zánětlivých a imunitně zprostředkovaných onemocnění u psů a koček.

Podávaná množství:

K perorálnímu podání. Psi a kočky: 0,5–2,0 mg na kg tělesné hmotnosti denně. U některých stavů, jako je anafylaxe, může být dostačující jednorázové podání, ale pro obecnější léčbu může být zapotřebí léčba po dobu jednoho až tří týdnů ve výše uvedených dávkách. Dávkování je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se použije nejnižší účinná dávka. Aby se minimalizovalo riziko adrenální insuficience, může být zavedena střídavá denní léčba s použitím dávek, které adekvátně kontrolují



příznaky. Psi by měli být dávkováni ráno a kočky by měly být dávkovány večer, aby se dávka shodovala s vrcholem endogenního kortizolu. Tablety lze rozdělit na 2 nebo 4 stejné části, aby bylo zajištěno přesné dávkování.

Ochranné lhůty:

Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte blistry v krabici, aby byl chráněn před světlem. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabici po „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci. Zbylé nepoužité části tablety vraťte zpět do blistru a spotřebujte do 4 dnů.

Zvláštní upozornění:

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh: Podávání kortikosteroidů vede spíše k zlepšení klinických symptomů než léčbě. Léčba by měla být kombinována s léčbou základního onemocnění a/nebo kontrolou prostředí.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat: V případech výskytu bakteriální infekce by měl být přípravek používán ve spojení s vhodnou antibakteriální léčbou. Farmakologicky účinné koncentrace dávek mohou vést k adrenální nedostatečnosti. To se může projevit zejména po vysazení léčby kortikosteroidy. Uvedený účinek lze minimalizovat zavedením podávání každý druhý den, pokud je to z praktického hlediska možné. Dávku je třeba snižovat a vysazovat postupně, aby nedošlo k náhlé adrenální nedostatečnosti (viz bod „Dávkování pro jednotlivé druhy, cesta a způsob podání“). Kortikoidy, jako je prednisolon, způsobují exacerbaci katabolismu proteinů. V důsledku toho je třeba přípravek podávat s opatrností u starších nebo podvyživených zvířat. Kortikoidy, jako je prednisolon, je třeba používat s opatrností u zvířat s hypertenzí, epilepsií, popáleninami, předchozí steroidní myopatií, u zvířat s oslabenou imunitou, u mladých zvířat mohou kortikosteroidy vést k zpomalení růstu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: Prednisolon nebo jiné kortikosteroidy mohou způsobit přecitlivělost (alergické reakce). Lidé se známou přecitlivělostí na prednisolon, jiné kortikosteroidy nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Aby se zabránilo náhodnému požití, zejména dítětem, musí se nepoužité části tablet vrátit na místo v otevřeném blistru a vložit zpět do krabíčky. V případě náhodného požití, zejména dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Kortikosteroidy mohou způsobit fetální malformace, proto je doporučeno, aby se těhotné ženy vyhnuly kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Po manipulaci s tabletami si ihned důkladně umyjte ruce.

Březost a laktace:

Nepoužívat během březosti. Laboratorní studie prokázaly fetální abnormality v průběhu rané březosti a potrat či předčasný porod při podání v pozdních stádiích březosti. Glukokortikoidy jsou vylučovány do mléka a mohou způsobit narušení růstu sajících mláďat. Proto by měl být přípravek použit u laktujících fen pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Fenytoin, barbituráty, efedrin a rifampicin mohou zrychlovat metabolickou clearance kortikosteroidů, což má za následek nižší hladiny v krvi a snížený fyziologický účinek. Souběžné podávání tohoto veterinárního léčivého přípravku s nesteroidními protizánětlivými léky může zhoršit ulcerace gastrointestinálního traktu. Podávání prednisolonu může vyvolat hypokalémii a v důsledku zvýšit riziko toxicity srdečních glykosidů. Riziko hypokalémie může být zvýšené, pokud je prednisolon podáván společně s draslíky šetřícími diuretiky. Při použití v kombinaci s inzulínem je doporučena zvýšená opatrnost. Léčba veterinárním léčivým přípravkem může narušit účinnost vakcinace. Při vakcinaci oslabenými živými vakcínami je třeba před léčbou a po léčbě dodržet dvoutýdenní interval.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování nevyvolá jiné nežádoucí účinky než ty, které jsou uvedeny v bodu „Nežádoucí účinky“. Neexistuje žádné specifické antidotum. Příznaky předávkování je nutno léčit symptomaticky.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Doba použitelnosti:

2 roky

Doba použitelnosti dělených tablet:

4 dny

Uchovávání:

Uchovávejte blistry ve vnější krabici v pořadí, aby byl chráněn před světlem. Jakákoli nespotebovaná část tablety by měla být vrácena do blistru a použita pro další podání.

Balení:

Blistr z neprůhledného PVC/hliníku. Papírová krabíčka s 1, 3, 5, 10 nebo 25 blistru po 10 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Živá hmotnost (kg)	Počet tablet Hedylon 5 mg pro psy a kočky	
	Minimální dávka 0,5 mg/kg ž. hm.	Maximální dávka 2 mg/kg ž. hm.
≤ 2,5 kg	¼	1
> 2,5–5 kg	½	1–2
> 5–7,5 kg	¾	2–3
> 7,5–10 kg	1	3–4
> 10–12,5 kg	1 ¼	4–5
> 12,5–15 kg	1 ½	5–6
> 15–17,5 kg	1 ¾	6–7
> 17,5–20 kg	2	7–8

Živá hmotnost (kg)	Počet tablet Hedylon 25 mg pro psy	
	Minimální dávka 0,5 mg/kg ž. hm.	Maximální dávka 2 mg/kg ž. hm.
> 10–12,5 kg	¼	1
> 12,5–25 kg	½	1–2
> 25–37,5 kg	¾	2–3
> 37,5–50 kg	1	3–4
> 50–62,5 kg	1 ¼	4–5
> 62,5–75 kg	1 ½	5–6



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622
+420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz