

Změna cílových druhů zvířat – Vigophos 100 mg/ml + 0,05 mg/ml

VIGOPHOS 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injekční roztok pro skot, koně a psy

Butafosfanum 100 mg/ml + Cyanocobalaminum (vitamin B12) 0,05 mg/ml



Změny:

Cílové druhy zvířat: skot, koně, psi

Indikace pro použití:

Všechny cílové druhy:

Podpůrná léčba a prevence hypofosfatemie nebo nedostatku kyanokobalaminu (vitaminu B12).

Skot:

Podpůrná léčba k obnovení přežvykování po chirurgickém ošetření dislokovaného slezu spojeného se sekundární ketózou.

Doplňková léčba porodních paréz k terapii Ca/Mg.

Prevence rozvoje ketózy, pokud je podáváno před otelením.

Koně:

Doplňková terapie u koní se svalovým vyčerpáním.

Dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání:

Skot a koně: Intravenózní podání.

Psi: Intravenózní, intramuskulární a subkutánní podání.

Dávka závisí na živé hmotnosti (ž. hm.) a kondici zvířete.

Druhy	Dávka butafosfanu (mg/kg ž.hm.)	Dávka kyanokobalaminu (mg/kg ž.hm.)	Objem dávky veterinárního léčivého přípravku	Způsob podání
Skot Koně	5–10	0,0025–0,005	5–10 ml/100 kg	i.v.
Druhy	10–15	0,005–0,0075	0,1–0,15 ml/kg	i.v. i.m., s.c.

Pro podpůrnou léčbu sekundární ketózy u krav podávejte doporučenou dávku po dobu tří po sobě jdoucích dnů.

Pro prevenci rozvoje ketózy u krav podávejte doporučenou dávku po dobu tří po sobě jdoucích dnů v období 10 dnů před očekávaným otelením.

U ostatních indikací by měla být léčba podle potřeby opakována.